

対象疾患:肝がん

↓:投与日

レジメン名: Ramucirumab単独療法

1コース: 14日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ラムシルマブ注	8mg/kg	↓													

レジメン名: Low dose FP療法(導入)

1コース: 7日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7
1	シスプラチン注	10mg/body	↓	↓	↓	↓	↓		
2	フルオロウラシル注	250mg/body	↓	↓	↓	↓	↓		

レジメン名: Low dose FP療法(維持)

1コース: 7日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7
1	シスプラチン注	10mg/body	↓						
2	フルオロウラシル注	250mg/body	↓						

レジメン名: Atezolizumab+Bevasizumab療法

1コース: 21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	アテゾリズマブ注	1200mg/body	↓																				
2	ベバシズマブ注	15mg/kg	↓																				

レジメン名: Durvalumab + Tremelimumab療法

1コース: 28日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デュルバルマブ注	1500mg/body 20mg/kg(体重30kg以下)	↓																				
2	トリメリムマブ注	300mg/body 4mg/kg(体重30kg以下)	↓																				

Tremelimumabは単回投与

22	23	24	25	26	27	28

レジメン名: Durvalumab + Tremelimumab療法

1コース: 28日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デュルバルマブ注	1500mg/body 20mg/kg(体重30kg以下)	↓																				

Durvalumab + Tremelimumab療法後の継続投与

22	23	24	25	26	27	28

(最終更新) 2024. 08

対象疾患: 胆道がん

↓: 投与日 → : 投与

レジメン名: GEM療法

1コース: 28日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	↓							↓							↓						

22	23	24	25	26	27	28

レジメン名: GEM+S-1療法

1コース: 21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	↓							↓													
2	S-1内服	1日2回															→						

レジメン名: GEM+CDDP療法

1コース: 21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	↓							↓													
2	シスプラチン注	25 mg/m ²	↓							↓													

レジメン名: GCS療法

1コース: 14日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	↓													
2	シスプラチン注	25 mg/m ²	↓													
3	S-1内服	1日2回								→						

レジメン名：Durvalumab + GC療法

1コース：21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デュルバルマブ注	1500mg/body 20mg/kg(体重30kg以下)	↓																				
2	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	↓							↓													
3	シスプラチン注	25 mg/m ²	↓							↓													

レジメン名：Durvalumab 維持療法

1コース：28日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デュルバルマブ注	1500mg/body 20mg/kg(体重30kg以下)	↓																				

Durvalumab+GC療法後の維持療法

22	23	24	25	26	27	28

レジメン名：Pembrolizumab (200)+GC療法

1コース：21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	↓																				
2	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	↓							↓													
3	シスプラチン注	25 mg/m ²	↓							↓													

Pembrolizumabは最大35サイクル

Cisplatinは最大8サイクル

GEMは疾患進行又は許容できない有害事象の発現等まで投与可能

(最終更新) 2024. 08

対象疾患：膵がん

↓ : 投与日 → : 投与

レジメン名：GEM療法

1コース：28日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	↓							↓							↓						

22	23	24	25	26	27	28

レジメン名：GEM+S-1療法

1コース：21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	↓							↓													
2	S-1内服	1日2回	—													→							

レジメン名：nab-PTX+GEM療法

1コース：28日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	パクリタキセル注 (アルブミン懸濁型)	125 mg/m ²	↓							↓							↓						
2	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	↓							↓							↓						

22	23	24	25	26	27	28

レジメン名：FOLFIRINOX療法

1コース：14日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	オキサリプラチン注	85 mg/m ²	↓													
2	イリノテカン注	180 mg/m ²	↓													
3	レボホリナート注	200 mg/m ²	↓													
4	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	↓													
5		2400 mg/m ²	—	→												

レジメン名：mFOLFIRINOX療法

1コース：14日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	オキサリプラチン注	85 mg/m ²	↓													
2	イリノテカン注	150 mg/m ²	↓													
3	レボホリナート注	200 mg/m ²	↓													
4	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	—	→												

レジメン名：FL+nal-IRI療法

1コース：14日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	イリノテカン注 (リポソーム製剤)	70 mg/m ²	↓													
2	レボホリナート注	200 mg/m ²	↓													
3	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	—	→												